



RAMIREZ FRAUSTO LUCERO GAUDALUPE

Expediente: 19982

Edad: 0 años.

Sexo: Femenino

DR(a). CUERVO MORENO EUNICE

Cita: 05/10/2015 13:40 Hrs.

Impresión: 05/10/2015 16:49 Hrs.

Gamm Renal MAG3 con diuretico

|                     |                |                          |                                  |
|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Tensión Arterial: / | Pulso: /minuto | Temperatura: °C          | Frecuencia Respiratoria: /minuto |
| Peso: kgs.          | Talla: mts.    | Indice de masa corporal: |                                  |
| CIE 10              |                |                          |                                  |

**ESTUDIO: GAMMAGRAFÍA RENAL PERFUSORA Y SECUENCIAL INTERVENCIONISTA**

**TÉCNICA:**

Se realizó centelleografía renal dinámica y secuencial en proyección posterior, previa administración intravenosa de una dosis de MAG 3 marcado con 3 mCi <sup>99m</sup>Tc mas 4 mg de FUROSEMIDE obteniéndose:

**RESULTADO:**

**Fase dinámica** escasamente valorable el paso del material, por la estatura del paciente.

La fase secuencial muestra:

**Riñón derecho** en situación habitual, de forma y tamaño aparentemente normales, la captación del radiofármaco es adecuada con distribución homogénea, con retención progresiva del material por pelvis renal, que condiciona discreto retardo en la fase de eliminación del material, siendo esta ultima casi completa al termino del estudio.

**Riñón izquierdo** con ausencia de captación del radiofármaco.

**Las curvas renográficas** muestran:

**Riñón derecho** con pendiente funcional ascendente, **función del 92.4%**, tiempo de captación máxima a los 8.5 min. (valor normal de 3-5 min.) Y pendiente de excreción descendente con eficiencia de salida del 50% a los 30 min. (valor normal mayor del 78%).

**Riñón izquierdo** sin pendiente funcional (valores de fondo).

**Flujo Plasmático renal derecho** = 83.3 ml/min.

**IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:**

- **EXCLUSIÓN RENAL FUNCIONAL IZQUIERDA, POR ESTE MÉTODO DE ESTUDIO.**
- **PIELECTASIA DERECHA CON ADECUADA RESPUESTA AL ESTIMULO DIURÉTICO, CON FUNCIÓN TUBULAR APARENTEMENTE CONSERVADA A CORRELACIONAR CON EL GRADO DE MADUREZ RENAL.**

Atentamente,

Dr. Jesús Pérez Nava  
Especialista en medicina nuclear